



**Deltalab**<sup>®</sup>  
deltametrina 0,2 mg/mL



**FORMA FARMACÉUTICA E APRESENTAÇÕES**  
Loção 0,2 mg/mL - Embalagem contendo 1 frasco de 100 mL.

**USO DERMATOLÓGICO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada mL contém:  
deltametrina ..... 0,2 mg  
excipientes..... q.s.p. .... 1 mL  
(metilparabeno, álcool etílico, fragrância de maçã verde, nonoxinol e água purificada)

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**Ação esperada do medicamento:**

A deltametrina atua como pediculicida e escabicida. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas.

**Cuidados de armazenamento:**

Conservar o medicamento ao abrigo da luz e calor excessivo (temperatura superior a 40 °C).

**Prazo de validade:**

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

**Aspecto físico/características organolépticas:**

Líquido fluido, incolor, com odor característico de maçã verde.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

**Gravidez e lactação:**

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe seu médico se está amamentando. Desconhecem-se efeitos adversos pelo uso do produto na gravidez ou lactação. Contudo, deve-se considerar o risco-benefício antes da indicação.

**Cuidados de administração:**

Siga sempre a orientação de seu médico, respeitando os horários, as doses e duração do tratamento. A administração conjunta do produto com outros medicamentos só deverá ser realizada após consulta do médico assistente. O uso em crianças e gestantes deve obedecer a cuidados e observações rigorosos. Deltalab<sup>®</sup> Loção deverá ser usado somente no corpo. Não usar o produto para sobrançelas ou cílios. No caso de contato com os olhos, lavá-los por 15 minutos com água corrente e procurar orientação médica. O produto deverá ser aplicado em local ventilado. Evitar contaminação de alimentos pelo produto. Não reutilizar o recipiente vazio.

**Como normas de higiene, é recomendado:**

- 1 - Ferver as roupas de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas.
- 2 - Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (pioelhos) ou fíriase (chatos), manter os cabelos curtos e limpos.
- 3 - Evitar exagero ao coçar, e colocar luvas de proteção nas crianças.
- 4 - Procurar descobrir possíveis portadores e possíveis contatos com eles ou seus objetos de uso.
- 5 - Alertar os responsáveis por instituições coletivas frequentadas pelo portador do parasita.

**Interrupção do tratamento:**

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem riscos, apenas cessará o efeito terapêutico.



**Reações adversas:**

Em alguns casos, o produto pode produzir, transitórias na maioria das vezes, algumas reações desagradáveis. Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

**Contraindicações:**

O produto é contraindicado para pacientes que apresentarem antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula, alergia respiratória e lesões de pele. Informe a seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

**Precauções:**

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica.

**INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS**

**INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO**

**NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS**

A deltametrina é a substância mais ativa da classe dos piretroides, substância sintética obtida por esterificação do ácido crisantêmico. A deltametrina apresenta elevado coeficiente de segurança e baixa toxicidade para mamíferos. Possui considerável efeito residual e alto poder letal contra pioelhos e ácaros. A deltametrina apresenta notáveis propriedades pediculicidas e escabicidas, sendo o *Pediculus humanus capitis*, *Pediculus humanus humanus*, *Phthirus púbis* e seus ovos extraordinariamente sensíveis à sua ação. A sua ação é seletiva e se dá após absorção da substância através do exoesqueleto de quitina dos ectoparasitas. Uma vez no interior do organismo do inseto, a deltametrina transportada pela hemolinfa fixa-se nos gânglios nervosos periféricos e nas estruturas motoras do sistema nervoso central, produzindo excitabilidade, incoordenação motora, paralisia, letargia e morte do parasita.

**INDICAÇÕES**

O produto está indicado no tratamento e profilaxia da pediculose (pioelhos), da fíriase (chatos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

**CONTRAINDICAÇÕES**

Hipersensibilidade à deltametrina, alergia respiratória e lesões de pele: feridas e queimaduras ou condições que possibilitem maior absorção.

**PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

O medicamento está indicado somente para uso tópico. Não deve ser ingerido ou inalado. Deve ser mantido fora do alcance dos olhos e mucosas. No caso de contato acidental com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente por alguns minutos. No caso de inalação ou irritação da pele, interromper o tratamento.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.

**REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS**

Podem ocorrer irritação cutânea, ocular e reações de hipersensibilidade, sobretudo do tipo alergia respiratória. No caso de uso em pele lesada por feridas ou queimaduras, pode ocorrer maior absorção da deltametrina, com efeitos gastrintestinais e neurológicos agudos.

**POSOLOGIA E MODO DE USAR**

Frictionar toda região afetada do corpo, caso necessário, deixando permanecer até o próximo banho. Usar durante 4 dias consecutivos. Deltalab<sup>®</sup> Loção deverá ser usado somente no corpo. O produto deve ser reaplicado após 7 dias, seguindo a posologia e modo de usar, para evitar uma possível reinfectação por permanência de ovos.

**SUPERDOSE**

- No caso de ingestão acidental, o tratamento é principalmente de suporte.
- Deve-se induzir o vômito nos indivíduos conscientes ou realizar lavagem gástrica, nos inconscientes.
- Pode-se administrar sais catárticos para maior trânsito intestinal e menor absorção intestinal da piretrina.
- No caso de inalação acidental, pode-se necessitar de respiração artificial.

**PACIENTES IDOSOS**

Não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



**SAC:**  
0800 600 0660

MULTILAB Ind. e Com. de Prod. Farm. Ltda.  
RS 401 - km 30 - n° 1009 - São Jerônimo - RS  
CEP 96700-000 - CNPJ 92.265.552/0001-40  
Reg. M.S. n° 1.1819.0006  
Farm. Resp.: Gabriela Heldt Motta - CRF-RS 13255  
Indústria Brasileira

